

目 次

原著論文

諏訪 剛： 和歌山県串本町姫の鯖島と仙右エ門出シで観察されたヒジキの生長特性	61
八谷光介・清本節夫・吉村 拓： 長崎県壱岐市郷ノ浦町地先におけるクロメ群落の現存量および生産量の季節変化	67
八谷光介・桐山隆哉・清本節夫・種子田雄・吉村 拓： 2013年に発生した長崎県壱岐市郷ノ浦町地先におけるアラメ・カジメ場の衰退過程について —夏季の高水温による発生と秋季の食害による拡大—	79
Hiroataka KAKITA, Hideki OBIKA, Hiroshi KAMISHIMA： Cultivable ephiphytic bacteria obtained from the unialgal culture strain of the red alga <i>Gracilariopsis chorda</i> (Holmes) Ohmi collected from the estuary of Katsuura River in Tokushima Prefecture in southwest Japan	95
Tadashi KAWAI, Dmitrii GALANIN, Zhanna TSKHAY, Elena LATOKOVSKAYA, Nobu NAGAI, Norishige YOTSUKURA： Relationship between occurrence of kelp species and water temperature in northern Hokkaido, Japan, and southern Sakhalin, Russia	107
会 告	
日本応用藻類学会第14回大会について	117
所属・勤務先、住所、メールアドレス等を変更された方へのお願い	117
Algal Resources誌への投稿のすすめ	117
投稿規定	118
執筆規定	118
編集委員会から	122